



Phosphate buffering in mangrove sediment pore water under eutrophication and deforestation influences

Grazielle Nascimento-Silva^{a,*}, Gabriela B. Oliveira^a, Christiène R.L. Matos^b, Edouard Metzger^c, Christian J. Sanders^d, Humberto Marotta^{a,e}, Rut Diaz^a, Gwenaël Abril^{a,f}, Wilson Machado^a

^a Program of Geochemistry, Federal Fluminense University, Niterói, RJ, Brazil


^b Museu Paraense Emílio Goeldi, MCTIC, Belém, Pará, Brazil

^c Laboratoire de Planétologie et Géosciences, CNRS, Université d'Angers, Nantes Université, Le Mans Université, Angers, France


^d Southern Cross University, National Marine Science Centre, Bay Drive, Korora, 2450 Coffs Harbour, Australia

^e Ecosystems and Global Change Laboratory (LEMG-UFF)/Brazilian Ocean Acidification Network (BrOA), Biomass and Water Management Research Center (NAB-UFF), Fluminense Federal University (UFF), RJ, Brazil


^f Laboratoire de Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques (BOREA), UMR 8067, Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, Paris, France



Caractérisation de la matière organique sédimentaire



Phosphore dissous et particulaire



Le sédiment de mangrove a une forte capacité tampon pour le phosphore y compris en milieu eutrophe et partiellement déforesté - Importance du rideau de fer (minéralogie/bioirrigation)